

## توضیح آنژیوکت :

آنژیوکت یا کاتتر عروق محیطی ، یک کاتتر (لوله پلاستیکی ) کوچک و قابل انعطاف است که در داخل رگ های محیطی بیمار، جهت تزریق مایعات به درون بدن ، از طریق رگ ها تعبیه می شود و مورد استفاده قرار می گیرد .

آنژیوکت به وسیله سوزنی که دارد وارد رگ بیمار می شود و زمانی که کاتتر در رگ بیمار قرار بگیرد ، سوزن یا همان نیدل از آنژیوکت خارج می شود و کاتتر در رگ بیمار باقی می ماند . سپس با استفاده از چسب روی پوست بیمار محکم و بدون حرکت ثابت می شود .

انواع مختلفی از آنژیوکت ها وجود دارد که در سایزهای مختلفی هستند و با توجه به سن ، وضعیت آناتومیکی بدن بیمار ، تشخیص بیماری و نوع مایعی که تزریق می شود ، سایزهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد .



۱

## موارد استفاده از آنژیوکت :

- زمانی که بیمار در بیمارستان بستری می شود و نیاز است که مدتی در بخش بماند
- زمانی که قرار است بیمار به اتاق عمل برود و عمل جراحی برای وی انجام شود
- زمانی که بیمار در اورژانس بستری می شود و قرار است که از طریق رگ دارو یا سرم دریافت کند
- در برخی موارد مانند رادیوگرافی ، سی تی اسکن و یا ام آر آی که با استفاده از تزریق ماده حاجب انجام می شود نیز لازم است که برای بیمار آنژیوکت فیکس شود



۲

## زمان تعویض آنژیوکت :

به دلیل این که آنژیوکت وارد بدن بیمار می شود و به صورت مستقیم با خون بیمار در ارتباط می باشد ، بنابراین مراقبت از آن و حفظ نکات بهداشتی در این مورد بسیار مهم می باشد .

چون ریسک عفونت در محل وجود آنژیوکت بالاست ، مراقبت های خاصی را نیز می طلبد .

در صورت عدم وجود سفتی ، قرمزی ، برآمدگی و درد معمولاً هر ۴۸ تا ۷۲ ساعت محل آنژیوکت تغییر داده می شود و در محل دیگری تعبیه می شود . این کار باعث پیشگیری از ورود میکروب ها به بدن و ایجاد عفونت در خون می شود .

هم چنین چسبی که برای فیکس کردن آنژیوکت استفاده شده است در صورت آلودگی واضح با ترشحات خونی یا سرم و یا کنده شدن ، نیز تعویض می شود .



۳



دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
بیمارستان سینا کامیاران

## پمفلت آموزشی مراقبت از آنژیوکت

واحد پرستاری آموزش و پیگیری بیمار

بازنگری سال ۱۴۰۳



## علائم هشدار:

در صورت بروز علائم زیر بلافاصله به پرستار خود اطلاع دهید، چون ممکن است که نشانه‌ی عفونت و عدم کارایی آنژیوکت باشد:

- تورم
- احساس سردی یا درد در محل تزریق
- احساس کسالت و ناخوشی
- تب
- قرمزی و حساس بودن ناحیه‌ی تزریق



## مراقبت از آنژیوکت:

- بهتر است که آنژیوکت در دست غیر غالب تعبیه شود
- در صورت فیکس شدن آنژیوکت در دست غالب، سعی کنید که در هنگام انجام کارهای روزمره از آن مراقبت کنید تا از رگ خارج نشود و کارایی خود را از دست ندهد
- در هنگام شستشوی دست‌ها مراقب باشید که تا حد امکان محل آنژیوکت خیس نشود
- در صورتی که چسب آنژیوکت خیس می‌شود، به پرستار خود اطلاع دهید تا چسب آن را تعویض نماید
- زمانی که در بیمارستان بستری می‌شوید سعی کنید لباس با آستین گشاد و آزاد بپوشید تا کم‌تر به آنژیوکت برخورد کند و هنگام تعویض لباس نیز آسیبی به محل آنژیوکت وارد نشود
- سعی نکنید که خودتان سرم را از آنژیوکت جدا کنید. برای این کار حتماً به پرستار اطلاع دهید
- توصیه می‌شود که بر روی دستی که آنژیوکت دارد نخوابید تا احتمال کنده شدن آن کاهش یابد